
NUEVA ESPECIE DE WILMATTEA (CACTACEAE) EN VENEZUELA

por LEON CROIZAT

El género Wilmattea, reconocido hace medio siglo por Britton & Rose (Cact. 2: 195. 1920; Backeberg, Kakt. Lexicon 455. 1966), ha incluido hasta hoy una sola especie, W. minutiflora (Br. & Rose), Br. & Rose, natural de Guatemala, Honduras y Honduras Inglesa (loc. tip. "Lake Izabal, Guatemala"; Flora Guatemala, Fieldiana Bot. 24, parte 7, Nº 1: 231-232. Fig. 37. 1961). Es fácil de entender que Britton & Rose ubicaran esta planta en primer lugar (Contr. U.S. Nat. Herb. 16: 240. 1913) bajo el género Hylocereus, ya que sus notas vegetativas corresponden muy cercanamente a las de este taxon. De hecho, tan sólo se distingue de él por la flor, la cual, en lugar de muy grande y vistosa, es diminuta (según la descripción típica de W. minutiflora alcanza tan sólo unos 5 cm. de largo). Lamentablemente no se conoce todavía el fruto.

Wilmattea venezuelensis Croizat, sp. nov. (Fig. 1).

Primo intuitu notis vegetativis notis ad *Hylocereum* Br. & Rose arcte accedit, at floribus longioribus (ad 7-8 cm.), bracteis superioribus exterioribus late oblanceolatis nec linearibus, 6-7 mm. latis,



bracteis ad perianthii basin impositis obvie triangularibus margine rubro-purpureis, optime a specie typica W. minutiflora, Guatemalae Hondurae atque Hondurae Anglicae incola, unica adhuc nota, discedit. A. Hylocerei spp. flore diminuto habitu diverso facillime distinguitur.

Typus: Zonas inundadas en invierno, Unidad I, al Este del Campamento Cachicamo, Este de El Cantón, Reserva Forestal Caparo, Estado Barinas, Venezuela, alt. 100 m., 11 de Abril de 1968, "sprangling elongated stems, near and above ground; stem 3-angled, gray-green; bracts of flowers green margined dull maroon"; J. A. Steyermark, G. Bunting, & C. Blanco 102114 (holotipo, VEN).

Wilmattea venezuelensis difiere de W. minutiflora por su flor más alargada (hasta 7-8 cm.), por las escamas superiores del perianto más anchas y —de manera muy obvia— por el lugar donde vive.